

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。【眼科用薬】

第3類医薬品

Vロート コンタクト PREMIUM

販売名:Vロートコンタクトプレミアム

乾き・ヒリつき^{*}による酷使して蓄積した疲れに。
6つの原因全てにアプローチ!

◆製品特徴

- ① コンタクトならではのつらい眼疲労の6つの原因にアプローチした処方設計
- ② 全ての有効成分、基準^{*}内最大濃度配合
- ③ 角膜ダメージ修復するビタミンAを、ロート史上コンタクト用目薬として基準^{*}内最大濃度配合
- ④ 目が疲れてリフレッシュしたい時にうれしい、気持ちのよいさし心地

※光線などによる軽度な炎症 *基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

角膜の傷^{*}を修復し、疲れを治す

#コンタクトなどによる軽度なこすれ

ビタミンA

ピント調節機能・
疲れを改善

ネオスチグミンメチル
硫酸塩

栄養補給・
疲れを改善

タウリン

血行促進・疲れを改善

ビタミンE

乾きによる
疲れを改善

コンドロイチン硫酸
エステルナトリウム

ヒリつき^{*}
による疲れを改善・
かゆみ抑制

クロルフェニラミン
マレイン酸塩

◆コンタクトレンズ装着時の注意

目の調子や体調が悪い場合は、無理に使用しないでください。コンタクトレンズ装着中に強い異物感や痛みがある場合や症状が続く場合は、レンズの使用を中止し、速やかに眼科を受診してください。

すべてのコンタクトレンズ装着中に使えます。また、レンズをはずした後にもご使用いただけます。(カラーコンタクトレンズ装着中には使用しないでください。)

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

裸眼

目薬には、ソフトコンタクトレンズ装着中に使用できるものと使用できないものがあります。ソフトコンタクトレンズを装着したまま目薬を使用する場合は、外箱や添付文書を確認し、必ず、ソフトコンタクトレンズ装着中に使用できる目薬を使用しましょう。

◆容器特徴

フリー
アングル
ノズル[®]



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式
スクリュー
キャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

		成 分	
		配合量	はたらき
全有効成分基準 ※内最大濃度配合	レチノールパルミチン酸 エステル(ビタミンA)	50,000単位 /100mL	摩擦などによる角膜ダメージを修復し、 目の疲れを改善します。
	ネオスチグミンメチル 硫酸塩	0.005%	ピント調節機能改善作用により、 目の疲れを改善します。
	クロルフェニラミン マレイン酸塩	0.03%	目のヒリつき※やかゆみなどの 不快な症状を抑えます。
	酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05%	血行を促進し、 目の疲れを改善します。
	タウリン	1%	栄養を補給して、 目の疲れを改善します。
	コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0.5%	潤いを保ち、角膜を保護し、 目の疲れを改善します。

【添加物】ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸Na、塩化Na、ポリドロン、ゴマ油、l-メントール、d-カンフル、グラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンヒマシ油、エドト酸Na、ピロ亜硫酸Na、塩酸ポリヘキサメド、pH調節剤

※基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲 ※光線などによる軽度な炎症

効能・効果

目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、目のかゆみ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えしないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、2～3ヶ月を目安にご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)