

おなかにやさしい
非刺激性成分

水酸化 マグネシウム

腸を直接刺激しないので、
お腹が痛くなりやすく、
クセになりにくい成分です。

【成分】100mL中
水酸化マグネシウム12g含有
添加物としてクエン酸水和物含有

注意

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人
(4) 腎臓病の診断を受けた人
2. 服用に際しては、中のボトルをよく読むこと
3. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
4. 小児の手の届かない所に保管すること

ストレスが原因の便秘に対しては、薬物治療だけではなくストレスの除去が大切です。また、食事や運動などの生活習慣の改善も組み合わせることをおすすめします。

お客さま安心サポートデスク: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1



販売名:ミルマグ液 第3類医薬品

便秘治療薬として用いる場合

【効能・効果】

○便秘 ○便秘に伴う次の諸症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振
(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

次の量を就寝前(又は空腹時)に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	5~17mL	1回
11才以上15才未満	3~11mL	
7才以上11才未満	3~8mL	
3才以上7才未満	2~5mL	
3才未満	服用しないこと	

制酸剤として用いる場合

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

【用法・用量】

次の量を食後1~2時間後又は就寝前に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3mL	3回
8才以上15才未満	2mL	
5才以上8才未満	1mL	
5才未満	服用しないこと	

飲み方

本剤を逆さまにし、均一になるようよく振り混ぜ、添付の計量カップで必要量を量り、コップ1~2杯の水に薄め服用してください。便秘治療薬としては水分を多く摂取するとより効果的です。※計量カップの目盛は目安です。

使用期限
(未開封時)

製造番号


副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931

押してあける



- ☑ コロコロ便になることが多い…
- ☑ ストレスに敏感に反応してしまう…
- ☑ 環境の変化で便秘になりやすい…
- ☑ 初めて便秘薬を使うから不安だ…

ストレスなどによる コロコロ便をするん!!



Mg
水酸化マグネシウム
<イメージ図>

＼ 制酸剤としても使えます /

中和作用

すでに出てしまっている胃酸を
中和して、胃酸の攻撃力を弱めます。

【成分】100mL中
水酸化マグネシウム 12g含有
添加物としてクエン酸水和物含有

飲み方

本剤を逆さまにし、均一になるようよく振り混ぜ、添付の計量カップで必要量を量り、コップ1~2杯の水に薄め服用する。便秘治療薬としては水分を多く摂取するとより効果的。*計量カップの目盛は目安。

便秘治療薬として用いる場合

【効能・効果】

○便秘 ○便秘に伴う次の諸症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、
腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	5~17mL	1回
11才以上15才未満	3~11mL	就寝前(又は空腹時)に
7才以上11才未満	3~8mL	服用すること
3才以上7才未満	2~5mL	
3才未満	服用しないこと	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

制酸剤として用いる場合

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、
胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3mL	3回
8才以上15才未満	2mL	食後1~2時間後又は就寝前に
5才以上8才未満	1mL	服用すること
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守すること
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (3)添付の計量カップは使用后、洗って清潔に保管すること

お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1



<使用期限、製造番号> ボトル底に記載